

อภิธานศัพท์
กลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
People who inject drugs : PWID population

ศัพท์	ความหมาย
Adult PWID / Men PWID	ชายผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
AIDS : Acquired immune deficiency synd	กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี
Amphetamine	ยาบ้า
ART: Antiretroviral Therapy	การรักษาด้วยยาด้านไวรัส
ARV : Antiretroviral	ยาด้านไวรัส
ATS : Amphetamine-Type Stimulants	สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
BCC : Behavior Change Communication	การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Buprenorphine	เป็นสารกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid, ยาออกฤทธิ์เหมือนฝิ่น) ทางคลินิกใช้ยาบิวพรีนอร์ฟินในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่ต้องเสพยาในขนาดสูงๆ ชื่อการค้าของยานี้ที่สามารถพบเห็นได้ เช่น Buprenex, Subutex, Suboxone, Butrans เป็นต้น
Crystal Meth	ยาไอซ์
DIC : Drop-in center	ศูนย์บริการสุขภาพในชุมชน (ศูนย์รถอปีน)
Dormicum or Midazolam	เป็นยานอนหลับ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดบางกลุ่ม นำไปฉีดให้ฤทธิ์เคลิ้ม เม้า ทดแทนการฉีดเฮโรอีน
DOT : Directly Observed Therapy	การกำกับการกินยา
Drug addiction / Substance use disorder	การติดยา เป็นอาการผิดปกติทางสมองที่เกิดจากการบริโภคสิ่ง/สารเสพติด
Drug Withdrawal	กลุ่มอาการขาดยา โดย ลงแดง เป็นอาการส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการที่เกิดจากการขาดยา
DU : Drug user	ผู้ขาย/ผู้ใช้สารเสพติด
Female PWID	ผู้หญิงผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ในทุกอายุ
Harm Reduction	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
HBV : Hepatitis B Virus	เชื้อไวรัสตับอักเสบบชนิด B
HCV : Hepatitis C Virus	เชื้อไวรัสตับอักเสบบชนิด C
HIV : Human Immunodeficiency virus	เชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเอดส์
HTC : HIV Testing Center	ศูนย์ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
IDU : Injection drug user	ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
KP : Key population	กลุ่มประชากรหลัก
Kratom	ใบกระท่อม มีสารไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง (CNS depressant) เช่นเดียวกับยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน เช่น psilocybin LSD และ ยาบ้า
Metamphetamine	ยาไอซ์
MMT : Methadone Maintenance Therapy	การบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว
Naloxone	นาลอคโซน เป็นสารออกฤทธิ์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มสารอนุพันธ์ฝิ่น ใช้ยับยั้งอาการการใช้ยาเกินขนาด
NSP : Needle and Syringe Programe	การแจกเข็มและอุปกรณ์สะอาดเพื่อใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดอย่างปลอดภัย
Opioid	ฝิ่น
Oral Fluid HIV Self -Testing	การตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจจากน้ำในช่องปาก
OST: Opioid substitution therapy	การบำบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธ์ฝิ่น
Overdose	การใช้ยาเกินขนาด
Partner	คู่ของผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ซึ่งประกอบด้วย คู่ขายยา หรือ คู่มีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นคู่ชั่วคราวหรือคู่ประจำ
Peer	เพื่อน เป็นสรรพนาม ที่คนทำงานด้านยาเสพติด นิยมใช้เรียกแทนผู้ใช้สารเสพติด เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
Peer Educator / Outreach Worker	เจ้าหน้าที่อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ขายยาเสพติด เคยใช้ยาเสพติดหรือไม่ใช้ยา ทำงานให้บริการสุขภาพเชิงรุก
PEP: Post-exposure prophylaxis	ยาด้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หลังการสัมผัสเชื้อ
PrEP: Pre-exposure prophylaxis	ยาด้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับผู้มีความเสี่ยงก่อนที่จะมีการสัมผัสเชื้อหรือมีความเสี่ยง
PWID : People who inject drugs	ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
RTCM : Real Time Cohort Monitoring	ระบบข้อมูลรายงานการบริการป้องกันเชิงรุกแบบ Real Time
STAR : Stop TB and AIDS Through RRT	โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR
STIs : Sexually Transmitted Infection	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
TB : Tuberculosis	วัณโรค
Tramadol	เป็นยาในกลุ่มโอปิออยด์ ใช้เป็นยาบรรเทาปวดสำหรับรักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง นิย
UIC : Uniqe Identifier Code	หมายเลขระบุตัวบุคคล
VCCT : Voluntary Confidential Counselin	การให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดโดยสมัครใจและเป็นความลับ
Young PWID	เยาวชนชายผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด อายุระหว่าง 10 -24 ปี